




















# Prognosekarte (Lokalitäten und Metallinhalte)

## Mittleres Erzgebirge (ROHSA 3.1)


## Zinn (Kassiterit) in lithologisch kontrollierten Mineralisationen

1 : 50.000

[illegible]

### Zinn (Kassiterit) in lithologisch kontrollierten Mineralisationen

**1 : 50.000**




## Anlage 6

November 2016

**Modelleingangsdaten** (1:600.000)

Modellparameter (geordnet nach Wichtigkeit)



### Modellparameter und deren Wichtung

[illegible]

Vergleich Trainingsdaten -  
Prognoseergebnis  
(Tonnen Zinn pro Gridzelle)

Histogramm der Zinninhalte pro Grdzelle im Modellgebiet

kurve

Gridzellen mit  
bekanntem Zinninhalt  
(innerhalb der  
Messgrenze)

## Modeling and simulation

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Archiv des LBLG | 08.01.00 |
| Archiv des LBLG | 08.01.00 |
| Archiv des LBLG | 08.01.00 |
| Archiv des LBLG | 08.01.00 |

1) Suchen Sie  
den Ort Gangit, Nordost (2000 m)  
auf  
der Karte "Zur Zeit der Revolution"  
und beschriften Sie ihn mit der  
Bezeichnung "Zur Zeit der Revolution".

|                    | 1981 | 1985 | 1991 | 1999 |
|--------------------|------|------|------|------|
| <i>D.</i>          |      |      |      |      |
| <i>L.A.</i>        |      |      |      |      |
| <i>K. Overland</i> |      |      |      |      |

ung (83.450 t),  
abfallmenge von  
ca. 700.000 t.  
suchungsgebiet

... 3 % über dem der Vorratszuwachs. Die Vorratszuwächse der bekannten Vorratsblöcke entfielen auf 11 % der Vorratszuwächse, während die Vorratszuwächse der unbekannten Vorratsblöcke auf 11 % der insgesamt 11 % der Vorratszuwächse entfielen.

wiedergefunden. Dieser Widerspruch ist eine Unter Berücksichtigung der 83.490 t ergibt sich damit ein Ingesamt wären in diesem

Beurteilung auf Werte zwischen

der bekannten Vorratsblöcke  
verteilt. Die je Rasterzeile  
ist. Dieser Wert wurde vor der  
1 (1000) und 1 (1000) Metallb

36 8 1 ur  
(10 Toor